

CONTROLE D'ORL 3eme rotation

Cochez la ou les réponses justes :

1- Une obstruction nasale unilatérale chronique peut être le signe de :

- a- Un corps étranger intra-nasal récent
- b- Un corps étranger intra-nasal ancien
- c- Un cancer des fosses nasales
- d- Un fibrome nasopharyngien

2- L'otite externe est une affection grave chez :

- a- Le cardiaque
- b- Le diabétique
- c- L'immunodéprimé
- d- Le patient sidéen

3- L'otoscopie chez un patient objectivant un encombrement associés à des plages noirâtres évoque :

- a- Un eczéma du conduit auditif externe
- b- Une otomycose
- c- Un furoncle du conduit auditif externe
- d- Une dermatose du conduit auditif externe

4- L'otite moyenne chronique simple se manifeste par :

- a- une otorrhée sur une perforation tympanique centrale
- b- une otorrhée fétide sur une perforation de la pars flaccida
- c- une otorrhée sur un polype provenant de la caisse du tympan
- d- une douleur lancinante sur une sténose du conduit auditif externe

5- Hypertrophie des végétations nasales peut provoquer :

- a- une otite moyenne aigue récidivante
- b- une otite seromucosée
- c- une dyspnée obstructive nocturne
- d- une détresse respiratoire aigue

6- devant une dysphonie chronique, on peut évoquer :

- a- un polype de la corde vocale
- b- un cancer de la glande thyroïde
- c- une laryngite bactérienne streptococcique aigue
- d- un cancer du cavum

7- la tuberculose laryngée peut se manifester à la laryngoscopie indirect par :

- a- une forme bourgeonnante
- b- un aspect de larynx sale
- c- un aspect granulomateux
- d- le diagnostic est histologique

8- une paralysie récurrentielle droite peut être provoqué par :

- a- une chirurgie thoracique gauche
- b- une chirurgie thyroïdienne

- c- un traumatisme cervical ✓
→ d- une laryngite pachydermique → dysphagie

9- une surdité de perception peut se voir lors de :

- a- la maladie de ménière ✓
 b- une tumeur du tronc cérébral ✓
c- une otite moyenne chronique simple
 d- une presbycusie ✓

10- l'otite moyenne chronique cholesteatomateuse peut entraîner :

- a- une surdité mixte ✓
c- b- une lésion du canal semi-circulaire externe ✓
c- c- une lyse de la chaîne ossiculaire ✓
c- d- une atteinte du sinus latéral ✓

11- un nourrisson présentant un syndrome infectieux, une dyspnée, une dysphagie, on peut évoquer :

- a- un corps étranger intra-laryngé *Ormu*
 b- une épiglottite ✓
c- une laryngite sous-glottique
d- une laryngite striduleuse

12- devant un vertige d'installation brutale, isolé et rapide, on évoque :

- a- une névrite vestibulaire
 b- un vertige paroxystique positionnel béhind ✓ PPB
c- une labyrinthite toxique
d- un neurinome de l'acoustique

13- dans le cancer du cavum le traitement chirurgical est réservé :

- a- aux formes récidivantes ✓
 b- aux reliquats ganglionnaires après radio-chimiothérapie ✓
c- aux stades 1 et 2
d- Aux formes localisées au cavum

14- Le nystagmus peut être :

- a- Horizontal-rotatoire dans le syndrome vestibulaire central
 b- Multidirectionnel dans la sclérose en plaque ✓
 c- Horizontal-rotatoire dans les labyrinthites infectieuses ✓
 d- Change de direction avec le changement de position du regard dans le syndrome vestibulaire central ✓

15- Une jeune femme consulte pour une surdité bilatérale prédominant à droite et d'aggravation progressive. En faveur du diagnostic d'otospongiose, on retient :

- A- L'aggravation de la surdité lors d'une grossesse ✓
 B- L'existence d'antécédents familiaux d'otospongiose ✓ *trans*
 C- Le caractère transitionnel de la surdité ✓
D- La constatation d'une perforation centrale du tympan. *typique par l'os*

16- Parmi les affections ci-dessous, laquelle ou lesquelles peuvent être responsables à la fois d'une obstruction nasale et d'une épistaxis ?

- a- Déviation de la cloison nasale
- b- Fibrome nasopharyngien
- c- Cancer du cavum
- d- La maladie de Rendu-Osler

17- l'angine à streptocoque B-hémolytique est fréquente :

- a- Chez l'enfant de moins de 03 ans
- b- Chez l'enfant de plus de 03 ans
- c- Dans sa forme vésiculeuse
- d- Dans sa forme érythémato-pultacée

18- les signes suivants sont en faveur d'une tumeur maligne de la parotide sauf un lequel ?

- a- augmentation progressive du volume
- b- une douleur
- c- une paralysie faciale périphérique
- d- un trismus

19- le diagnostic de certitude d'une tuberculose ganglionnaire repose sur :

- a- L'intradermo-réaction à la tuberculine
- b- L'échographie
- c- La radio du thorax
- d- L'examen anatomopathologique

20- parmi les caractéristiques de l'angine diphtérique :

- a- comporte des membranes blanchâtres non adhérentes
- b- à déclaration obligatoire
- c- l'isolement du patient n'est pas obligatoire
- d- elle peut évoluer vers la détresse respiratoire