

- 3- Quelles sont les mesures générales préconisées au cours de la dermatite atopique ?
- a- Prendre des bains chauds biquotidiens
 - b- Appliquer quotidiennement un émollient
 - c- Ne plus faire vacciner son enfant atteint de dermatite atopique
 - d- Eviter de trop se vêtir
 - e- Suivre un régime alimentaire strict
- 2- Le diagnostic de certitude de l'eczéma de contact repose sur :
- a- Le dosage des IgE totales
 - b- NFS : hyper éosinophilie
 - c- Les patch tests
 - d- Les photo tests
 - e- La biopsie cutanée
- 3- Le prurit au cours de la gale est :
- a- modéré nocturne respectant le visage
 - b- intense permanent
 - c- familial
 - d- intense cédant aux antihistaminiques
 - e- toutes les réponses sont fausses
- 4- Le psoriasis de l'enfant est caractérisé par :
- a- Des lésions en gouttes
 - b- Des lésions en placards
 - c- Polymorphisme lésionnel
 - d- Atteinte prédominante du tronc
 - e- Atteinte prédominante des mains
- 5- Le diagnostic du psoriasis inversé repose sur :
- a- Atteinte des muqueuses
 - b- Atteinte des plis
 - c- Présence d'autres lésions de psoriasis à distance du site spécifique
 - d- Examen mycologique des squames
 - e- L'aspect macroscopique des lésions
- 6- Le traitement de la teigne tendante microsporique repose sur :
- a- Terbinafine par voie générale
 - b- Griseofulvine par voie générale
 - c- Dermocorticoïde en pommade
 - d- Acide fucidique en crème
 - e- Kétoconazole en crème

- 7- L'acné est une maladie :
- a- Infectieuse chronique du follicule pilosébacé.
 - b- Inflammatoire chronique du follicule pilosébacé.
 - c- Dont la prévalence est de 80 % de la population générale.
 - d- Dont la prévalence est de 80 % de la population entre 12 et 20 ans.
 - e- Toujours primitive et commence à la puberté.
- 8- le traitement de l'ulcère de jambe artériel repose sur :
- a- La contention élastique seule.
 - b- La contention élastique associée à une détersion rigoureuse de la plaie.
 - c- Une revascularisation en urgence.
 - d- Une antibiothérapie adaptée.
 - e- Toutes les réponses sont fausses
- 9- Au cours de l'ulcère de jambe, la description du tégument péri-ulcéreux constitue un bon marqueur de :
- a- L'origine vasculaire de l'ulcère.
 - b- La sévérité de l'ulcère.
 - c- L'ancienneté de l'ulcère.
 - d- L'étiologie de l'ulcère.
 - e- Toutes les réponses sont justes.
- 10- Parmi les facteurs suivants quels sont ceux impliqués dans la genèse du carcinome basocellulaire :
- a- Le soleil.
 - b- Les radiations ionisantes.
 - c- Le tabac.
 - d- Les infections virales à HPV oncogène.
 - e- Le xeroderma pigmentosum.
- 11- Parmi les traitements suivants, quel est (quels sont) le (les) traitement(s) possible(s) du mélanome :
- a- La chirurgie.
 - b- Les chimiothérapies.
 - c- La radiothérapie.
 - d- Les biothérapies.
 - e- La vaccination anti tumorale.
- 12- Tous les diagnostics suivants sont des diagnostics différentiels du mélanome sauf un, lequel ?
- a- Les naevi.
 - b- Les mélanoses circonscrites.
 - c- Les kératoses séborrhéiques.
 - d- Les verrues vulgaires.
 - e- Les carcinomes basocellulaires « tatoués »
- 13- La forme la plus fréquente du carcinome basocellulaire (CBC) est :
- a- Le CBC acrolentigineux.
 - b- Le CBC sclérodermiforme.
 - c- Le CBC superficiel.
 - d- Le CBC nodulaire.
 - e- Le CBC muqueux.

14- Le traitement de choix du carcinome basocellulaire est :

- a- La cryothérapie.
- b- La vaccination anti tumorale.
- c- La chirurgie.
- d- La radiothérapie.
- e- La chimiothérapie.

15- La corticothérapie locale est indiquée dans :

- a- Le psoriasis palmoplantaire
- b- Le psoriasis du siège chez le nourrisson
- c- L'ulcère de jambe artériel
- d- La pemphigoïde bulleuse
- e- L'eczéma des paupières

16- L'urticaire aiguë est due à :

- a- Un œdème dermique par vasodilatation capillaire
- b- Un œdème dermique par vasoconstriction capillaire
- c- Le principal médiateur est la bradykinine
- d- La libération de l'histamine par les lymphocytes T
- e- L'activation spécifique ou non spécifique des mastocytes

17- Quelle(s) est(sont) l'(les) urticaire(s) physique(s) ?

- a- Cholinergique
- b- De contact au latex
- c- Retardée à la pression
- d- Solaire
- e- Aquagénique

18- Au cours du pemphigus vulgaire on peut observer :

- a- Une éruption faite de cocardes
- b- Des lésions buccales
- c- Des plaques urticariennes
- d- Des bulles sous-épidermiques
- e- La présence d'IgA sur la zone de la membrane basale à l'IF

19- Dans la furonculose chronique, les gîtes habituels du staphylocoque doré sont généralement situés au niveau de 2 des 5 régions ci-dessous :

- a- Narines
- b- Cuir chevelu
- c- Cicatrices d'anciens furoncles
- d- Fesses
- e- Épiderme palmoplantaire

20- Le streptocoque peut être responsable des dermatites suivantes sauf une :

- a- Erythème noueux
- b- Furonculose
- c- Erysipèle
- d- Scarlatine
- e- Impétigo

INESSMC
Bibliothèque Char
Copy Service