

Questions de Synthèse le : 11/06/2014

1. Le traitement de l'ulcère de jambe artériel repose sur :
 - a) La contention élastique seule.
 - b) La contention élastique associée à une élévation rigoureuse de la plaie.
 - c) Une revascularisation en urgence.
 - d) Une antibiothérapie à large spectre.
 - e) Une cicatrisation dirigée de la plaie.
2. Au cours de l'ulcère de jambe, la description du tégument péri-ulcéreux constitue un bon marqueur de:
 - a) L'origine vasculaire de l'ulcère.
 - b) La sévérité de l'ulcère.
 - c) L'ancienneté de l'ulcère.
 - d) L'étiologie de l'ulcère.
 - e) Toutes les réponses sont justes.
3. Devant une acné inflammatoire d'une femme enceinte, quel traitement choisissez-vous ?
 - a) Isotrétinoïne.
 - b) Fmocloxaciline en topique.
 - c) Retinoides topiques.
 - d) Peracnyl de benzoyle
 - e) Gluconates de zinc.
4. La leishmaniose cutanée est :
 - a) Une infection parasitaire cutanée d'évolution bénigne
 - b) Souvent associée à une leishmaniose viscérale
 - c) De contamination est interhumaine
 - d) Confirmée par un prélèvement mycologique des lésions
 - e) Traité efficacement par des antibiotiques
5. Le traitement de choix de la leishmaniose cutanée est :
 - a) Métronidazole
 - b) Antimoniote de méglumine (glucantime)
 - c) Sulfamides
 - d) Bêta lactamines
 - e) Antifongiques.
6. Les dermocorticoïdes sont:
 - a) Des corticoïdes à usage cutané
 - b) Des corticoïdes à usage systémique
 - c) Pourvus d'une une action anti-inflammatoire, antimicrobique et immunosuppressive
 - d) Peuvent être à l'origine de troubles pigmentaires
 - e) Peuvent être indiqués sur des lésions d'acné

7. Les champignons de type dermatophyte sont :

- a) Hydrophiles
- b) Kératinophiles
- c) Touchent uniquement la peau
- d) Touchent uniquement les muqueuses
- e) Responsables de candidoses.

8. Parmi ces examens complémentaires, lequel est systématiquement demandé dans l'ulcère de jambe :

- a) Artériographie.
- b) Électrophorèse de l'FFh.
- c) Ac antiphospholipides, Ac anti DNA.
- d) Echo-Doppler vs.
- e) Phlébographie.

9. Le traitement de choix du carcinome basocellulaire est :

- a) La cryothérapie.
- b) La vaccination anti tumorale.
- c) La chirurgie.
- d) La radiothérapie.
- e) La chimiothérapie

10. Le carcinome basocellulaire est un cancer cutané :

- a) Se développe souvent de novo.
- b) Se développe souvent sur une lésion pré-cancéreuse.
- c) De mauvais pronostic
- d) Métasteuse souvent à distance.
- e) De diagnostic clinique.


11. Le pronostic des mélanomes est conditionné par :

- a) L'indice de Breslow.
- b) La distance au mélanome.
- c) Le siège de la tumeur.
- d) La survie ou les naevus préexistants.
- e) Le sexe du patient.

12. L'herpès circiné est :

- a) Fréquent chez l'enfant d'âge scolaire
- b) Fréquent chez le nourrisson
- c) D'origine candidosique
- d) D'origine dermatophytique.
- e) Sensible aux antibiotiques locaux.

13. le psoriasis de l'enfant est caractérisé par :

-  Des lésions en gouttes X.
- b) Aggravation par les infections virales
- c) Aggravation par les infections bactériennes ORL.
- d) Réponse thérapeutique meilleure avec la Photothérapie.
- e) Toutes les réponses sont justes.

14. L'urticaire chronique est caractérisée par :

- a) Une évolution des lésions depuis plus de 6 semaines
- b) Une évolution des lésions depuis plus de 6 mois
- c) Une étiologie le plus souvent connue
- d) Une réponse le plus souvent aux antihistaminiques
- e) Une réponse le plus souvent aux corticoïdes

15. Néonide (Locapred[®]) est un dermocorticoïde :

- a) De classe 2 (activité modérée)
- b) De classe 3 (activité forte)
- c) Peut être appliqué sur les plis
- d) Peut être appliqué sur le visage
- e) Prescrit pour traiter les dermatoses vésiculaires

16. Au cours du pemphigus vulgaire on peut observer :

- a) Une éruption cutanée en cocardes
- b) Des érosions buccales
- c) Des plaques urticariennes
- d) Des bulles cotarées
- e) Un dépôt d'IgA sur la zone membranaire basale à l'IFD.

17. La pemphigose bulleuse est :

- a) Souvent précédée d'un prurit
- b) Fréquente chez l'enfant.
- c) Associée à des plaques urticariennes ou eczémateuses
- d) Associée à une atteinte muqueuse constante.
- e) Caractérisée par une atteinte muqueuse rare.

18. Parmi les facteurs de risque suivants, lequel n'est pas associé au mélanome?

- a) Des antécédents d'expositions solaires intenses.
- b) Les antécédents familiaux de mélanome.
- c) Un nombre élevé de kératoses séborrhéiques.
- d) Les antécédents personnels de mélanome.
- e) La couleur claire de la peau et des cheveux.

19. La dermatite atopique :

- a) Débuté souvent entre 1 et 3 ans
- b) Débuté souvent entre 3 et 9 mois
- c) Est un eczéma constitutionnel
- d) L'association à un eczéma de contact est possible
- e) La guérison se voit à l'âge adulte

20. L'urticaire profonde :

- a) Plus prurigineuse que douleuruse
- b) Touche le plus souvent le tronc
- c) Ne répond jamais aux antihistaminiques
- d) Nécessite souvent une confirmation histologique
- e) Peut être aigüe ou chronique