

Contrôle de Synthèse d'Ophtalmologie  
(Durée de l'épreuve 45 minutes)

Cet examen comprend un examen théorique : 20 QCM et un examen pratique : 02 cas cliniques

1) La myopie maladie :

- A. Est une myopie évolutive ; ✓
- B. nécessite une surveillance régulière ; ✓
- C. associe des altérations de la rétine et / ou de la choroïde ;
- D. peut se compliquer d'hémorragies rétinienne ;
- E. peut se compliquer de décollement de rétine. ✓

2) L'uvéa est composée de :

- A. La rétine ;
- B. La choroïde ; ✓
- C. Le corps ciliaire ; ✓
- D. La pupille ;
- E. L'iris. ✓

3) Devant un œil rouge, certains signes marquent la gravité d'une conjonctivite. Lesquels ?

- A. Les sécrétions ; ✗
- B. Le larmoiement ; ✓
- C. La baisse d'acuité visuelle ; ✓
- D. Le chemosis ; ✗
- E. La photophobie. ✓

4) Quels sont les symptômes qui orientent vers un glaucome congénital :

- A. La photophobie ; ✓
- B. Le larmoiement ; ✓
- C. Le Blépharospasme ; ✓
- D. Les opacités cornéennes ;
- E. La rougeur oculaire.

5) La correction d'un presbyte sans antécédents d'amétropies peut se faire par :

- A. Un verre convergent et un cylindre positif ;
- B. Des lentilles de contact ;
- C. Le presbylasik ;
- D. Un cylindre positif ; ✓
- E. Un cylindre négatif.

06) Quels sont les causes de baisse de l'acuité visuelle sur un œil blanc chez un patient diabétique ?

- A. Un glaucome néovasculaire ; ✗
- B. Un œdème maculaire diabétique ✓
- C. Une rétinopathie diabétique non proliférante sévère ;
- D. Un décollement de la rétine ; ✓
- E. Une cataracte métabolique. ✓

07) L'appareil lacrymal est :

- A. Composé de la glande lacrymale principale et les voies de drainage ;
- B. La glande lacrymale principale est localisée au niveau de la partie supérieure du canthus interne ;
- C. La glande lacrymale principale est composée d'une portion palpébrale et d'une portion orbitaire ; ✓
- D. Le canal lacrymo-nasal s'ouvre directement au niveau du cornet nasal moyen ;
- E. Le canal lacrymo-nasal s'ouvre directement au niveau du cornet nasal inférieur.

08) Quel est parmi les signes suivants celui qui caractérise la toxicité oculaire à l'Amiodarone ?



- A. Pigmentation vitrénne
- B. Pigmentation irienne
- C. Dépôts cristalliniens
- D. Kératopathie en vortex
- E. L'hypertonie oculaire.

09) Quels sont les diagnostics à évoquer devant un ulcère dendritique ?

- A. Kératite à pneumocoque ✗
- B. Kératite à adénovirus ✗
- C. Kératite herpétique ✓
- D. Absès de cornée
- E. Kératite zostérienne

10) Le traitement d'un corps étranger cornéen superficiel associe :

- A. Un antibiotique topique
- B. Un cicatrisant ✓
- C. Un AINS
- D. Un pansement oculaire ✓
- E. L'Extraction du corps étranger ✓

11) Un chalazion est :

- A. Est une tumeur palpébrale bénigne ✓
- B. Est infection d'une glande pilo-sébacée
- C. Est un granulome inflammatoire d'une glande de de Zeiss
- D. Est un granulome inflammatoire d'une glande de de Meibomius
- E. Il peut compliquer un vice réfractif chez l'enfant

12) Parmi les lésions suivantes quelle (s) est (sont) celle (s) qui peut (peuvent) se compliquer de glaucome secondaire à angle ouvert :

- A. Une plaie cornéosclérale ; ✗
- B. Un hyphéma ; ✓
- C. Une récession de l'angle ; ✗
- D. Une luxation postérieure du cristallin ; ✓
- E. Une luxation antérieure du cristallin. ✗

13) Quelles sont les complications de la crise du Glaucome primitif à angle fermé :

- A. La kératopathie en bandelette
- B. L'atrophie du nerf optique ✓
- C. La cataracte ✓
- D. L'ophtalmie sympathique
- E. La cécité. ✓

14) Les altérations oculaires des antipaludéens de synthèse sont :

- A. L'Altération du champ visuel périphérique ;
- B. La cataracte ;
- C. La maculopathie en œil de bœuf ; ✓
- D. L'altération de la vision des couleurs ;
- E. L'Altération du champ visuel des 10° centraux.

15) A partir de quel chiffre parle-t-on d'hypertonie oculaire chez le myope fort ?

- A. 18mmhg ; ✓
- B. 14 mmhg ;
- C. 21 mmhg ; ✓
- D. 26mmhg ;
- E. 12mmhg.

16) En cas de rétinopathie diabétique :

- A. L'hyperglycémie chronique est un facteur de risque majeur ✓
- B. L'ischémie rétinienne induit la sécrétion du VEGF ✓
- C. La forme non proliférante sévère se manifeste par des néovaisseaux pré-rétiniens
- D. L'HBA1C doit être inférieure à 7% chez le diabétique type 1
- E. Le traitement par laser est indiqué dans les formes proliférantes

17) Les complications de la rétinopathie diabétique proliférante sont :

- ABC
- A. Le décollement de la rétine ✓
  - B. L'hémorragie intra-vitréenne ✓
  - C. Le glaucome néovasculaire ✓
  - D. La rubéose irienne ✓
  - E. L'hémorragie pré-rétinienne ✓

18) le diagnostic différentiel de l'exophtalmie se fait avec :

- ACD
- A. La buphtalmie ✓
  - B. L'endophtalmie *Controlat* ✓
  - C. L'exorbitisme ✓
  - D. La rétraction palpébrale ✓
  - E. La myopie modérée ✗

19) L'orbitopathie dysthyroïdienne associe :

- CNE
- A. Exophtalmie souvent unilatérale ✓
  - B. Diplopie par paralysie des nerfs oculomoteurs ✓
  - C. Rétraction des paupières ✓
  - D. Myosite ✓
  - E. Parfois une hypothyroïdie ✓

20) Le diagnostic clinique du trachome dans les cas douteux repose sur la présence de deux des signes suivants :

- CD
- A. Hyperplasie papillaire ✓
  - B. Follicules limbiques ou focettes d'Herbert ✓
  - C. Ligne d'ARLT ✓
  - D. Trichiasis ✓
  - E. Inflammation intense ✓

### Cas clinique N01

Un jeune homme de 24 ans se présente aux urgences ophtalmologiques pour une douleur oculaire droite intenses évoluant depuis 3 jours associée à un larmoiement, une gêne à la lumière et un flou visuel. A l'inspection l'œil droit est rouge, vous ne notez pas de sécrétions

1) Quels diagnostics évoquez-vous en priorité :

- 547  
02.09
- A. Kératite aigue ✓
  - B. Glaucome néovasculaire ✓
  - C. Conjonctivite bactérienne ✗
  - D. Crise de glaucome par fermeture de l'angle ✗
  - E. Uvéite antérieure ✓

2) Quels signes à l'examen clinique recherchez-vous pour les distinguer :

- A. Synéchies irido-cristalliniennes ✓
- B. Rubéose irienne ✓
- C. Effet tydall ✓
- D. Précipités rétrodescemétiques ✓
- E. Cercle périkératique ✓

3) Quels autres diagnostics pouvez-vous évoquer :

- F
- A. Conjonctivite allergique ✗
  - B. Conjonctivite virale ✗
  - C. Hémorragie sous conjonctivale ✗
  - D. Sclérite postérieure ✗
  - E. Corps étranger cornéen ✓

4) A l'interrogatoire vous apprenez que c'est le cinquième épisode de ce type de symptôme par an et que le patient est suivi pour une maladie de système type maladie de Behçet .

Quel est alors le diagnostic le plus probable :

- A. Kératite aigue



- B. Glaucome néovasculaire
- C. Conjonctivite bactérienne
- D. Crise de glaucome par fermeture de l'angle
- E. Uvéite antérieure ✓

5) Quelle sera votre conduite à tenir :

- A. Hypotonisants
- B. Antibiotiques locaux ×
- C. Cicatrisants en collyre
- D. Corticoïdes locaux ✓
- E. Mouillants ×

### Cas clinique N02 :

Dans la rue vous êtes le témoin d'un accident survenu chez un ouvrier travaillant à la préparation de ciment, une projection accidentelle de ciment s'est porté sur les yeux de ce jeune de 27 ans

1) Quels gestes effectuez-vous pour la prise en charge immédiate de ce patient :

- A. Lavage oculaire immédiat abondant ✓
- B. Le lavage se fait avec une solution alcaline ×
- C. Lavage à l'eau de robinet ✓
- D. Extraire les corps étrangers visible dans les culs de sac
- E. Transfert aux urgences ophtalmologiques ✓

2) Le patient arrive aux urgences ophtalmologiques. Que faites- vous maintenant :

- A. Administration d'anesthésique topique ×
- B. Poursuivre l'irrigation avec soluté isotonique ✓
- C. Vérification et nettoyage des voies lacrymales ✓
- D. Eversion des paupières ✓
- E. Test à la fluorescéine

3) Quelles structures de l'œil peuvent être atteintes par ce type de traumatisme :

- A. Conjonctive ✓
- B. Cornée ✓
- C. Sclère ×
- D. Cristallin ×
- E. Rétine ×

4) Lors de votre examen, vous notez la présence d'une kératite ponctuée superficielle. quel sera votre traitement :

- A. Collyre antibiotique ✓
- B. Pommade cicatrisante ✓
- C. Substituts lacrymaux
- D. Déclaration d'un accident de travail ✓
- E. Surveillance clinique

5) Quels sont les différents types de brulures oculaire :

- A. Brulure par coup d'arc ✓
- B. Brulure thermique
- C. Brulure par acide
- D. Brulure par base ✓
- E. Brulure par ultra- violet



Département de Médecine de Constantine-Epreuve  
**SYNTHESE-OPHTALMOLOGIE-(théorie +pratique) le**  
**04-07-2019**

Date de l'épreuve : 04/07/2019

Corrigé Type

Barème par question : 0.666667

N°	Rép.
1	ABCDE
2	BCE
3	CDE
4	ABC
5	BC
6	BDE
7	CE
8	D
9	CE
10	ABDE
11	ADE
12	BCD
13	BCE
14	CDE
15	A
16	ABE
17	ABCDE
18	ACD
19	CDE
20	BC
21	ADE
22	ACDE
23	DE
24	E
25	D
26	ACDE
27	ABCDE
28	ABCD
29	ABCDE
30	ABCDE

Dr. MED. NICHE S  
Maître Assistant  
en Ophtalmologie