

1-Un vertige de Ménière est un motif fréquent d'hospitalisation aux urgences. Cette pathologie est en rapport avec :

- a) une labyrinthite inflammatoire.
- b) une fistule labyrinthique.
- c) un traumatisme de l'oreille.
- d) un hydrops labyrinthique. ✓
- e) une dégénérescence du nerf auditif.

2-Un vertige de Ménière se caractérise par les signes suivants. Lesquels ?

- a) un vertige récidivant d'une durée de quelques minutes lors de chaque crise.
  - b) un vertige avec un syndrome drops attaque.
  - c) un vertige associé à une surdité de transmission et des bourdonnements d'oreille. ✓
  - d) un vertige récidivant d'une durée de quelques heures lors de chaque crise. ✓
  - e) une répétition aléatoire des crises vertigineuses. ✓
- 2* *= acouphènes*

vppb

3-Un vertige paroxystique périphérique bénin se caractérise par :

- a) une durée de quelques heures.
- b) une grande crise vertigineuse à compensation progressive.
- c) un vertige pouvant être associé à une surdité.
- d) un vertige rotatoire positionnel. ✓
- e) un vertige qui dure quelques minutes (30s) < 1 min. ✓

4-une otite moyenne aigue se caractérise par :

Punctiforme

- a) une otorrhée purulente fétide
- b) un bombement du tympan. ✓
- c) un vertige associé à une surdité et des bourdonnements d'oreille
- d) une perforation centrale large. ✓
- e) une fermeture spontanée de la perforation après cicatrisation. ✓

5-Devant une otorrhée chronique droite, quels sont les signes qui doivent faire évoquer un cholestéatome ?

- BCD
- a) une perforation tympanique antéro-inférieure droite
  - b) une perforation atticale droite
  - c) une crise de vertige avec syndrome vestibulaire harmonieux déficitaire\*
  - d) une surdité mixte
  - e) des débris blanchâtres dans le conduit auditif externe droit

6-Parmi les items suivants, lesquels retenez-vous comme complication possible d'une otite moyenne aiguë ?

7- Une névrite vestibulaire :

- BR
- a) est souvent bilatérale
  - b) provoque un syndrome vestibulaire harmonieux
  - c) provoque un vertige paroxystique de quelques minutes
  - d) nécessite une exploration audiométrique
  - e) nécessite un repos strict au lit
- non, une névrite vestibulaire avec mobilisation rapide.

Un homme de 70 ans diabétique se plaint d'une otalgie lancinante, une otorrhée et une réduction de plénitude de l'oreille, quel est le diagnostic le plus probable :

- a) une otite moyenne chronique cholestéatomateuse
- b) une otite externe
- c) un eczéma du conduit
- d) Une perichondrite
- e) un érysipèle du pavillon auriculaire

9- patient âgé de 60 ans se présente au pavillon des urgences ORI pour dyspnée laryngée, phagie, quels sont les diagnostics que vous évoquez ?

- a) une laryngite chronique
- b) un cancer du larynx
- c) un cancer du larynx avec extension à l'œsophage
- d) une sténose sous-gloTTique
- e) un corps étranger intra-bronchique

10- Un nourrisson de 20 mois est amené aux urgences ORL pour une tuméfaction orbitaire rouge, douloureuse avec rhinorrhée purulente homolatérale, quels sont les diagnostics à évoquer ?

- a) une sinusite maxillaire aigue
- b) une complication orbitaire d'une sinusite maxillaire
- c) une ethmoïdite aigue
- d) une sinusite frontale aigue
- e) une sinusite frontale compliquée

11- Le traitement du cancer du larynx :

- a) est essentiellement chirurgical
- b) la radio-chimiothérapie est le traitement de choix
- c) la radiothérapie doit précéder tout acte chirurgical
- d) est basé sur l'administration de l'iode radioactif
- e) est basé sur la curithérapie

12- Le diagnostic du phlegmon péri amygdalien est évoqué devant :

- a) les deux amygdales sont rouges, tuméfiées à l'examen clinique
- b) un bombement du voile du palais avec trismus
- c) un trismus avec angine érythémateuse
- d) une angine pseudomembraneuse
- e) une ulcération du voile du palais

13- une adénopathie jugulo-carotidienne haute de 03 cm de diamètre, fixe, évoluant depuis 03 mois :

- Ponctif
- a) fait évoquer une tuberculose ganglionnaire -
  - b) la pratique d'une nasofibroscope est nécessaire -
  - c) le diagnostic le plus probable est le cancer du cavum -
  - d) la biopsie est le premier geste à faire
  - e) une TDM cervicale est toujours demandée -

14- Lors d'une épiglottite chez un nourrisson de 02 ans, le traitement

- a) est surtout médical : corticothérapie, antibiothérapie,
- b) oxygénothérapie
- c) l'intubation est le premier geste à faire

d) la trachéotomie est le seul moyen pour lutter contre la dyspnée

e) nécessite l'hospitalisation en soins intensifs

15-une déviation de la cloison nasale peut donner :

a) une épistaxis

b) une obstruction nasale -

c) une adénopathie cervicale

d) une mauvaise haleine

e) ne rhinorrhée aqueuse

16-lors d'une labyrinthite infectieuse :

a) la pression du tragus provoque un nystagmus -

b) l'aspiration au niveau de l'oreille provoque un nystagmus

c) la palpation de la mastoïde provoque un nystagmus

d) la palpation de la région sous-lobulaire provoque un nystagmus

e) la réalisation d'une audiométrie provoque un nystagmus

17-la méningite est une complication de :

a) l'otite moyenne aiguë -

b) l'otite moyenne chronique cholestéatomateuse -

c) la sinusite frontale -

d) l'otomyxose

e) l'erysipèle auriculaire

18-l'audiométrie tonale est basée sur :

a) la transmission d'un son à travers un casque posé sur l'oreille du patient et l'enregistrement d'une courbe -

b) la transmission d'un son par un vibreur plaqué sur la mastoïde du patient et l'enregistrement d'une courbe -

c) la transmission des sons graves seulement

d) la transmission des sons aigus seulement

e) la transmission des sons graves et aigus -



19-la laryngoscopie indirecte :

- a) est l'image du larynx réfléchi dans un miroir -
- b) est la visualisation directe du larynx
- c) est l'examen para clinique principal dans l'exploration du larynx
- d) est effectuée sous anesthésie générale
- e) est effectuée sous anesthésie locale

20-la tuberculose ganglionnaire :

- a) est traitée initialement par la chimiothérapie anti-bacillaire
- b) est traitée initialement par un curage ganglionnaire
- c) la chirurgie est systématique après traitement aux anti bacillaires
- d) la chirurgie est utilisée après échec du traitement médical -
- e) le traitement est immédiatement commencé après avoir effectué une intradermo-réaction à la tuberculine qui est revenue positive