

Contrôle de synthèse d'ORL – juin 2014 –

Chez Yacine  
INESSMC  
Bibliothèque Chalet  
Copy Service

Cochez la ou les réponse(s) juste(s) :

- 1- L'otite externe :
  - a- Est une pathologie du sujet âgé
  - b- Est une pathologie qui se manifeste par une tuméfaction retro-auriculaire
  - c- Est exprimé par une douleur à la traction du pavillon auriculaire
  - d- Est dangereuse chez le diabétique
  - e- Evolue souvent vers l'abcès cérébral
- 2- L'examen ORL lors d'une otite externe nécrosante :
  - a- Objective une sténose totale du conduit auditif externe
  - b- Objective une sténose partielle du conduit auditif externe
  - c- Une paralysie faciale périphérique
  - d- Un granulome inflammatoire du conduit auditif externe
  - e- Une perforation large réactionnelle du tympan
- 3- L'otite moyenne aigue du nourrisson peut se manifester par :
  - a- Un tableau infectieux sans signes d'appel otologique
  - b- Un tableau de diarrhée et vomissement
  - c- A l'otoscopie : une perforation postéro-inferieure marginale
  - d- Une paralysie faciale périphérique
  - e- A l'otoscopie : un tympan bombée, avec décollement du pavillon auriculaire
- 4- Un enfant de 10 ans se présente en consultation pour une otorrhée purulente fétide évoluant depuis 03 mois, l'otoscopie objective une perforation de la membrane de shrapnell :
  - a- Une otite moyenne chronique cholestéatomateuse est confirmée
  - b- Une otite moyenne chronique cholestéatomateuse est probable et l'IRM qui confirme le DGC
  - c- Une otite moyenne chronique simple est évoquée
  - d- Une otite externe compliquée est évoquée
  - e- Une otite moyenne aigue est probable
- 5- Mr a.s âgé de 30 ans se présente en consultation pour une adénopathie cervicale haute de 04 cm de diamètre avec épistaxis de faible abondance. quel(s) est (sont) le ou les diagnostics évoqués
  - a- Un cancer du cavum
  - b- Un fibrome nasopharyngien
  - c- Une hémopathie maligne
  - d- Une tuberculose ganglionnaire
  - e- La maladie de Rondu-osler
- 6- Patient M A se présente aux urgences ORL pour épistaxis de moyenne abondance :
  - a- un abord veineux solide avec prise des constantes hémodynamiques sont parmi les premiers gestes à faire
  - b- un méchage antéropostérieur doit être réalisé en urgence
  - c- la transfusion sanguine est un geste d'urgence
  - d- un pic hypertensif est un diagnostic à évoquer
  - e- La cautérisation des fosses nasales est le geste hémostatique le plus sûr
- 7- Un enfant de 04 ans est ramené par ces parents aux urgences ORL pour rhinorrhée unilatérale fétide évoluant depuis 1.5 jours, quel (s) est (sont) le(s) dgc évoqué(s) ?
  - a- Un cancer du cavum
  - b- Un corps étranger intra-nasal
  - c- Une atrésie choanale bilatérale
  - d- Une atrésie choanale unilatérale

- Le métronidazole est utilisé pour :
- a- Une pathologie survenant chez les filles
  - b- Le diagnostic de certitude est clinique
  - c- Le diagnostic de certitude est posé par la biopsie
  - d- Le diagnostic de certitude est posé par la TDM
  - e- Le diagnostic de certitude est posé par la nasofibroscopie
- 9- La tuberculose ganglionnaire cervicale :
- a- Est confirmée par l'intradermoréaction à la tuberculine
  - b- Est confirmée par l'étude histologique d'un ganglion prélevé
  - c- Est confirmée par l'échographie cervicale
  - d- Le traitement est basé sur la chimiothérapie anti-bacillaire
  - e- Le traitement est basé sur la chirurgie première
- 10- Le cancer du cavum peut se manifester par :
- a- Une obstruction nasale unilatérale - épistaxis + paralysie du IV homolatéral
  - b- Une atteinte du IX, X, XI paires crâniennes
  - c- Une lyse de la base du crâne
  - d- Des douleurs lombaires
  - e- Une otite séro-muqueuse
- 11- Une dysphonie postopératoire après thyroïdectomie totale est causée par :
- a- Une infection postopératoire
  - b- Une lésion du nerf récurrent
  - c- Un hématome de la cavité opératoire
  - d- Une lymphorrhagie
  - e- Une cellulite postopératoire
- 12- Le phlegmon péri-amygdalien :
- a- Se manifeste par un trismus
  - b- Se manifeste par une dysphagie
  - c- Est une collection de pus entre l'amygdale et le muscle
  - d- Est une collection de pus intra-amygdalienne
  - e- Le traitement est basé sur le drainage chirurgical
- 13- La dyspnée laryngée est :
- a- Une bradypnée inspiratoire
  - b- Une bradypnée expiratoire
  - c- S'exprime par un cornage
  - d- S'exprime par un wheezing
  - e- Associée à une cyanose des extrémités
- 14- Une dysphonie chronique est causée par :
- a- Un polype de la corde vocale
  - b- Un reflux gastro-œsophagien
  - c- Une intubation prolongée
  - d- Un cancer de l'œsophage
  - e- Une tumeur médiastinale
- 15- Le signe de Moore :
- a- La mobilisation du larynx provoquant un craquement est pathologique
  - b- La mobilisation du larynx provoquant un craquement n'est pas pathologique
  - c- Est positif dans les cancers étendus du larynx
  - d- Est négatif dans les cancers étendus du larynx

- a- L'inhalation de corps étranger est le dgc évoqué  
b- L'ingestion de corps étranger est le diagnostic évoqué  
c- Une radiographie du thorax pose le diagnostic de corps étranger intra-bronchique  
d- l'exploration endoscopique bronchique s'impose  
e- l'exploration endoscopique digestive s'impose
- 7- la forme histologique la plus fréquente dans le cancer du nasopharynx est :  
a- carcinome épidermoïde peu différencié  
b- adénocarcinome peu différencié  
c- carcinome épidermoïde bien différencié  
d- adénocarcinome bien différencié  
e- carcinome épidermoïde moyennement différencié
- 8- lors d'une sinusite maxillaire chronique  
a- la rhinoscopie antérieure montre du pus dans le méat moyen  
b- la rhinoscopie antérieure montre du pus dans le méat inférieur  
c- la palpation des points sinusiens est douloureuse  
d- le diagnostic est confirmé par la TDM  
e- le diagnostic est confirmé par rhinoscopie postérieure
- 19- une obstruction nasale est due :  
a- une déviation de la cloison nasale  
b- une rhinite infectieuse  
c- un cancer du cavum  
d- une sinusite frontale  
e- un cancer du sinus maxillaire
- 20- la laryngoscopie directe en suspension :  
a- est réalisée sous anesthésie locale  
b- est réalisée sous anesthésie générale  
c- permet de faire des biopsies  
d- permet d'explorer l'œsophage  
e- permet d'explorer le larynx et l'hypopharynx
- 21- le neurinome de l'acoustique se manifeste par :  
a- une surdité de transmission  
b- une surdité de perception  
c- une surdité mixte  
d- un vertige  
e- des acouphènes
- 22- la maladie de Ménière est :  
a- due à une hyperpression endolymphatique  
b- due à un cancer du sac endolymphatique  
c- due à une extension d'une infection de l'oreille moyenne  
d- secondaire à une labyrinthite  
e- de cause infectieuse
- 23- le vertige positionnel paroxystique bénin est :  
a- bref dure quelques secondes  
b- dure quelques heures  
c- isolé  
d- associé à des signes cochléaires  
e- associé à des signes neurologiques
- 24- le vertige central est causé par  
a- un accident vasculaire cérébelleux

c- une névrite vestibulaire

d- une labyrinthite

e- une tumeur de la fosse cérébrale postérieure

25- la maladie de Ménière :

a- se manifeste par des acouphènes

b- se manifeste par des signes neurovégétatifs

c- évolue vers l'accentuation du vertige

d- évolue vers l'accentuation de la surdité

e- le traitement est essentiellement chirurgical

26- la labyrinthite toxique est causée par les médicaments suivants :

a- la streptomycine

b- la gentamycine

c- la lincomycine

d- les céphalosporines

e- les aminosides

27- l'abcès périorbitaire compliqué :

a- une ethmoïdite

b- une sinusite frontale

c- un cancer du cavum

d- une déviation de la cloison nasale

e- une atrésie choanale

28- à l'acoumétrie le weber :

a- est pathologique si le patient entend les vibrations d'un seul coté

b- est pathologique si le patient entend les vibrations des 02 cotés

c- témoigne d'une surdité de transmission si le patient entend du même cote que le coté malade

d- témoigne d'une surdité de perception si le weber est latéralisé du coté non malade

e- témoigne d'une surdité de transmission si le weber est latéralisé du coté sain

29- le cancer du larynx est :

a- un cancer radio-induit

b- survient surtout chez les patients aux antécédents alcoolo-tabagiques

c- survient chez les patients exposés à l'amiante

d- survient suite à une infection par l'EBV virus

e- survient chez les patients exposés à la poussière de bois

30- la laryngite sous-glottique chez l'enfant :

a- est d'installation brutale

b- débute par un syndrome grippal ou rhinopharyngé banal

c- associe une dyspnée laryngée, une toux aboyante et une fièvre

d- donne une dyspnée larynge isolée

e- le traitement est basé sur la trachéotomie



Université de Constantine 3

Faculté de Médecine Pr B. Bensmail

*affichage*

# Département de Médecine de Constantine - Synthèse d' ORL - A6 - \*15/06/14\*F.Z\*

Date de l'épreuve : 12/06/2014

Page 1/1

Corrigé Type

*Class. Yacine*  
**INESSMC**  
Bibliothèque Chalet  
Copy Service

N°	Rép.
1	CD
2	ABCD
3	ABDE
4	A
5	AC
6	AD
7	B
8	D
9	BD
10	ABCDE
11	B
12	ABCE
13	ACE
14	ABCE
15	BDE
16	AD
17	A
18	ACE
19	ABCD
20	BCE
21	BDE
22	A
23	AC
24	ABE
25	ABD
26	ABE
27	AB
28	ACD
29	B
30	BC

*Dr. N. Bensmail*  
 Professeur Associé  
 Université de Constantine 3  
 Faculté de Médecine Pr B. Bensmail