

EXAMEN DE SYNTHÈSE D'ORL

1) La dyspnée laryngée

- a) Est une bradypnée expiratoire
- b) Est une polypnée
- c) Est une bradypnée inspiratoire
- d) Peut se voir dans un stade avancé du cancer du larynx
- e) Peut se voir dans une papillomatose laryngée.

2) La dysphonie est un motif de consultation habituel dans les affections suivantes sauf une, laquelle ?

- a) Granulome post intubation
- b) Laryngite chronique
- c) Paralysie récurrentielle
- d) Les tumeurs sous-glottiques
- e) Kissing nodule

3) On doit hospitaliser en urgence :

- a) Le corps étranger intra-bronchique
- b) L'épistaxis grave
- c) L'angine diphtérique
- d) La dysphonie chronique
- e) L'angine syphilitique

4) Le diagnostic de certitude du carcinome épidermoïde des fosses nasales repose sur

- a) La rhinoscopie antérieure
- b) Le scanner
- c) L'IRM
- d) La biopsie + étude anatomopathologique
- e) La nasofibroscopie

– 5) Le traitement de l'otite moyenne aiguë, avec des signes généraux importants, chez le nourrisson de 16 mois est :

- a) Traitement local par des antibiotiques et des corticoïdes
- b) Traitement antibiotique par voie générale probabiliste contre l'*Haemophilus influenzae* et le *staphylococcus pneumoniae* + antipyrétique et antalgique
- c) Traitement antibiotique par voie générale probabiliste anti-staph – anti-anaérobie + antipyrétique et antalgique
- d) Amoxicilline + acide clavulanique + antipyrétique et antalgique
- e) Seulement des antipyrétiques et des antalgiques

EXAMEN DE SYNTHÈSE D'ORL

6) devant une obstruction nasale unilatérale chez un adolescent avec une épistaxis homolatérale que peut-on évoquer comme diagnostique

- a) un UCNT du cavum
- b) un cancer de l'éthmoïde
- c) un fibrome nasopharyngien
- d) un carcinome épidermoïde des fosses nasales
- e) un sarcome du cavum

7) dans les sinusites maxillaires aiguës

- a) La douleur est sus orbitaire
- b) La rhinoscopie montre du pus au niveau du méat moyen
- c) Constitue une urgence médicale
- d) Est toujours d'origine dentaire
- e) Est la plus fréquente des sinusites aiguës

8) Herpangine :

- a) Infection par le virus COXSACKIE du groupe A
- b) Touche surtout l'adulte jeune et les adolescents à état général médiocre
- c) Un herpès labial et narinaire est souvent associé
- d) Due au virus herpès simplex VHS
- e) Elle est souvent virale (EBV, oreillons, grippe, rougeole, rubéole.)

9) chez une patiente atteinte d'une maladie de Ménière de l'oreille droite en pleine crise l'examen objectif :

- a) Un WEBER latéralisé à droite
- b) Un WEBER latéralisé à gauche
- c) Épreuve des indices : déviation à droite
- d) Épreuve de Romberg : chute à droite
- e) Nystagmus vertical

10) chez une patiente atteinte d'une otospongiose :

- a) la surdité est souvent bilatérale
- b) la surdité est de type perceptionnel
- c) le traitement est purement médical
- d) la TDM des rochers confirme le diagnostic
- e) la chirurgie est le traitement de choix

11) A propos de l'otite moyenne chronique cholestéatomateuse, quelles sont les propositions justes ?

EXAMEN DE SYNTHÈSE D'ORL

- a) Elle est dite dangereuse
- b) Elle peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel
- c) Elle peut mettre en jeu le pronostic vital
- d) Elle expose inévitablement à la survenue de complications
- e) Elle peut guérir spontanément

12) un homme âgé de 54 ans alcool-tabagique qui présente une dysphonie chronique évoluant depuis 03 mois quels sont les deux premiers diagnostics à évoquer :

- a) Tuberculose laryngée
- b) Laryngite aiguë
- c) Dysplasie laryngée
- d) Paralysie récurrentielle gauche
- e) Cancer laryngé

13) L'hyperlaxité excessive des structures du larynx avec aspiration de la margelle laryngée lors de l'inspiration est :

- a) Une papillomatose laryngée
- b) Un stridor laryngé congénital essentiel
- c) Une laryngomalacie
- d) Une laryngite sous glottique
- e) Une paralysie des dilatateurs du larynx

14) Concernant la maladie de Rendu-Osler, quelle est la proposition exacte ?

- a) C'est une affection héréditaire autosomique récessive
- b) Les télangiectasies se développent sur l'ensemble du corps
- c) L'épistaxis est rarement associée à des télangiectasies de la cavité orale
- d) L'exclusion des cavités nasales est systématique
- e) L'absence de couche musculaire et élastique de la paroi artérielle est à l'origine de la formation d'ectasies vasculaires

15) Les fausses membranes de la diphtérie sont

- a) Détachables
- b) N'épargnant pas la luette
- c) Hémorragique
- d) Non confluentes
- e) Adhérentes

16) L'otite externe maligne nécrosante

- a) Est plus fréquente chez l'enfant
- b) Est un cancer de l'oreille externe
- c) Donne rarement des métastases
- d) Touche surtout les diabétiques
- e) Peut aussi évoluer sur tous les terrains immunodéficients

EXAMEN DE SYNTHÈSE D'ORL

17. Les complications endocrâniennes de l'otite moyenne aiguë sont

- a) La mastoïdite
- b) La paralysie faciale périphérique
- c) La labyrinthite
- d) L'abcès intracérébral
- e) La méningite otogène

18) Que retrouve-t-on parmi les causes possibles de l'épistaxis ?

- a) L'insuffisance hépatique
- b) Les traitements anticoagulants ou antiagrégant
- c) L'hypertension artérielle
- d) La maladie de Willebrand
- e) La chirurgie nasosinusienne par voie endoscopique

19) Le neurinome de l'acoustique :

- a) Est une tumeur maligne
- b) Fréquent sur la partie vestibulaire de la 8^{ème} paire crânienne
- c) L'examen complémentaire le plus fiable pour le diagnostic est le scanner
- d) Appelé aussi schwannome de l'acoustique
- e) Il peut aussi se manifester par une surdité soudaine.

20) La sinusite la plus fréquente chez l'enfant est

- a) Maxillaire
- b) Ethmoïdale
- c) Frontale
- d) Sphénoïdale
- e) Pan sinusite

Bon courage