

Faculté de Médecine de Constantine Département de Médecine
EHS de Psychiatrie M.Belamri Constantine
Examen De Synthèse Module de psychologie
19/06/2017

1. Au cours de la maladie, dans la réaction d'ordre narcissique:
 - a) Certains patients sont inhibés
 - b) la maladie devient une source d'insatisfaction
 - c) elle est différente de la régression
 - d) les patients dépriment
 - e) les patients peuvent devenir auto agressifs

2. L'avancé en âge s'accompagne d'une :
 - a) diminution du risque de dépendance
 - b) accentuation de l'autonomie
 - c) diminution des chances de vivre en bonne santé
 - d) augmentation du risque de dépendance
 - e) peut s'accompagner d'un épanouissement pour certains

3. Le stress:
 - a) est un processus qui comprend une réaction psychologique et physiologique
 - b) est un processus qui répond à une agression
 - c) comprend une phase d'alarme, une phase de déni, une phase de dépression, et une phase d'acceptation
 - d) peut être positif ou négatif
 - e) peut être cognitif, affectif ou physique

4. L'angoisse parentale lors de la maladie de l'enfant est plus forte quand:
 - a) le risque d'handicaps est certain
 - b) si le pronostic vital n'est pas encore engagé
 - c) s'il y a des troubles de la personnalité chez les parents
 - d) si il y a des séparations régulières
 - e) si l'enfant est âgé

5. parmi les caractéristiques de la maladie:
 - a) elle est la conséquence d'une atteinte de l'intégrité du sujet
 - b) Elle gêne l'exercice normal de la vie
 - c) elle n'entraîne pas une rupture de l'équilibre antérieur
 - d) les représentations imaginaires sont importantes
 - e) elle est une épreuve

6/- le patient réagit à sa maladie en fonction :

- a) **De son âge**
- b) De ses antécédents familiaux
- c) **De sa personnalité**
- d) De ses antécédents personnels psychotiques
- e) essentiellement de son médecin traitant

7/- la régression au cours de la maladie peut se traduire par :

- a) **diminution des intérêts**
- b) Une pensée bizarre
- c) **Un égocentrisme**
- d) Une augmentation du risque d'altération de l'humeur
- e) Une altération du processus de guérison

8/- la régression est pathologique si :

- a) Elle est trop courte
- b) Elle est trop importante en excentricité
- c) **Elle est trop importante en durée**
- d) **Elle est trop longue**
- e) elle signifie que le patient va guérir rapidement

9/- Au cours de la maladie, les bénéfices secondaires :

- a) Ils sont toujours inconscients
- b) **Ils peuvent être conscients**
- c) **ils sont la conséquence de la maladie**
- d) permettent systématiquement d'éviter les obligations familiales
- e) interviennent dans l'apparition de la maladie

10/- le vieillissement :

- a) C'est l'ensemble des processus psychopathologiques liés à l'âge
- b) **C'est un processus très lent**
- c) C'est l'intrication des facteurs génétiques et psychotiques
- d) **C'est l'intrication des facteurs génétiques et sédentaires**
- e) Doit être indifférencié des manifestations des maladies

11/- la vieillesse physiologique :

- a) est appelée démence
- b) **est appelée sénescence**
- c) correspond à l'immaturité
- d) correspond pas aux maladies dues à l'âge
- e) les maladies psychologiques liées à l'âge avancé.

12/- la douleur :

- a) Est une impression normale et parfois agréable
- b) Est une expérience sensorielle agréable
- c) C'est une impression anormale et désagréable
- d) **c'est une expérience sensorielle désagréable**
- e) elle est toujours psychogène

13/- le placebo est mesurable sur :

- a) neutralisme gastrique
- b) **niveau de lipoprotéine**
- c) **numération des globules blancs (éosinophiles et lymphocytes)**
- d) numération des plaquettes
- e) taux de créatinine sanguine

14/- le traitement des douleurs psychogènes fait appel aux :

- a) **Antidépresseurs sérotoninergiques**
- b) **Antidépresseurs noradrénergiques**
- c) Antidépresseurs de 4^{ème} génération
- d) Antalgiques sérotoninergiques
- e) antalgiques noradrénergiques

15/- les soignants peuvent avoir plusieurs réactions envers les patients en fin de vie :

- a) **L'évitement**
- b) La dramatisation
- c) La contagion
- d) la contamination
- e) **La rationalisation**

16/- le travail psychologique en fin de vie a pour objectifs :

- a) déterminer si le patient va être déprimé ou non
- b) Empêche le patient de prendre conscience de son rapport à son corps
- c) De savoir si le patient est prêt ou non à mourir
- d) Aider la famille à oublier que leur parent va mourir
- e) **Faciliter le fait que la mort puisse s'inscrire dans un processus de continuité de la vie**

17/- la psychologie signifie :

- a) Elle est le résultat de l'interaction de l'être humain et de sa famille
- b) **Est une science qui ne s'oppose pas à la psychiatrie**
- c) c'est une sous spécialité de la psychiatrie
- d) c'est est une branche des sciences isotériques
- e) **Elle est le résultat de l'interaction de l'être humain et de son environnement**

18/- parmi les facteurs entravant la sexualité :

- a) Une première expérience sexuelle
- b) **une éducation rigide**
- c) un traumatisme psychotique
- d) **une maladie infectieuse**
- e) **une dépression**

19/- un trouble de la sexualité :

- a) Concerne rarement les 2 partenaires
- b) confronte le couple a un apaisement
- c) **Peut trouver sa solution dans l'apprentissage d'un comportement plus satisfaisant**
- d) c'est toujours le résultat d'une mésentente dans le couple
- e) Est toujours lié aux convictions religieuses et morales du ou des 2 partenaires

20/- chez l'homme, parmi les motifs de consultation pour trouble sexuel chez l'homme :

- a) **éjaculation précoce**
- b) Douleur au moment du rapport sexuel
- c) La frigidité
- d) **l'éjaculation rétrograde**
- e) vaginisme

21/- l'impuissance primaire :

- a) Survient après une période où il y a eu des rapports insatisfaisants
- b) Survient quand il y a eu des rapports satisfaisants
- c) Est typique de blocage dû à un abus sexuel durant l'enfance
- d) **Peut être dû à un blocage lié à une homosexualité refoulée**
- e) **peut être dû à une infériorité par rapport à la femme.**

22/- la frigidité est :

- a) Due exclusivement à un trouble du désir
- b) Due exclusivement à une cause organique
- c) **c'est aussi une incapacité à éprouver du plaisir**
- d) **parfois due à une souffrance psychique**
- e) **le traitement se fait par une information sur la vie sexuelle.**

23/- la dyspareunie :

- a) **Est un trouble de sensation**
- b) **douleurs sans contracture vaginale**
- c) Est une douleur à l'éjaculation
- d) Est un trouble de déglutition
- e) **le traitement nécessite une psychanalyse**

24/- la perversion sexuelle est :

- a) un trouble du désir sexuel
- b) elle dévie la pulsion sexuelle de son endroit
- c) **Est une pathologie qui dévie la pulsion sexuelle**
- d) un trouble du plaisir sexuel
- e) **elle dévie la pulsion de son but**

25/- l'étude de la relation médecin malade:

- a) **Considère que l'homme malade l'est dans sa totalité**
- b) ne prend pas en considération le patient
- c) prend en considération surtout le malade
- d) **Concerne les réactions psychologiques du malade face a son médecin**
- e) **permet d'améliorer la prise en charge**

26/- face à la maladie, le malade :

- a) **Développe un sentiment de rejet**
- b) **Développe un sentiment de culpabilité**
- c) Développe un sentiment de grandeur
- d) **Prend conscience des bénéfices secondaires et s'en sert**
- e) Met en place des mécanismes d'auto défense

27/- parmi les mécanismes de défenses face à la maladie :

- a) **La régression**
- b) **Le déni**
- c) **La sublimation**
- d) la conjonction
- e) **dénégation**

28/- au cours de l'isolation :

- a) **Le malade n'a plus de participation affective à sa maladie**
- b) Le malade participe affectivement à sa maladie
- c) **il devient indifférent**
- d) Le malade responsabilise les autres de ce qui lui arrive
- e) le malade peut agresser le médecin

29- dans la pathologie psychosomatique on retrouve :

- a) **Une pensée opératoire avec une carence fantasmatique**
- b) Une facilite a parler de ses émotions
- c) **Une surcharge émotionnelle dans le SNA avec passage du psychologique au physiologique**
- d) une tendance au raisonnement psychotique
- e) Une hypoxie thymie

30/- l'alexithymie :

- a) Est le contraire d'indifférence affective
- b) Se caractérise par l'incapacité à éprouver des sentiments
- c) **Se caractérise par l'incapacité à communiquer ses émotions**
- d) **Se caractérise par une vie imaginaire riche**
- e) Se caractérise par une dépendance

Bon courage

Corrigé Type Module de psychologie médicale (synthèse) **Corrrrrrigé**

questions	réponses
1	ACD
2	CDE
3	ABD
4	ACD
5	BDE
6	AC
7	AC
8	CD
9	BC
10	BD
11	B
12	D
13	BC
14	AB
15	AE
16	E
17	BE
18	BDE
19	C
20	AD
21	DE
22	CDE
23	ABE
24	CE
25	ADE
26	ABD
27	ABCE
28	AC
29	AC
30	CD

Dr MADJOUF Z
Née M...
EHS Psychiatrie
Constantine