

Cochez la ou les bonnes réponses.

Q.1. Parmi les produits anticancéreux suivants, lequel est le plus préconisé ?

- A- L'etoposide
- B- La doxorubicine
- C- Le docétaxel
- D- Le 5 fluorouracil
- E- Le Cisplatine.

B

Q.2. Quelles sont les règles qui régissent le choix de prescription d'un antalgique ?

- A. La bonne tolérance
- B. Le bon moment
- C. La voie intraveineuse
- D. Le bon prix
- E. L'antalgique qui donne le moins d'effet secondaires.

B.E

Q.3. L'objectif de l'hormonothérapie est de priver les cellules tumorales de l'influence de l'hormone, le mécanisme de ces médicaments peut se situer :

- A. Au niveau du système régulateur
- B. Au niveau de l'ADN
- C. Au niveau du noyau
- D. Au niveau de l'ARN m
- E. Sur une protéine extracellulaire.

A.C

Q.4. Les principaux mécanismes d'intervention hormonale pour le cancer de la prostate sont :

- A. La réapparition de l'hormone circulante
- B. L'inhibition de la synthèse du dérivé actif (les antiaromatases)
- C. L'inhibition de la synthèse du dérivé actif (la 5-déhydro-testostérone)
- D. L'action d'une antihormone au niveau du récepteur
- E. L'action d'une antihormone au niveau noyau.

C. D

Q.5. Les Antiaromatases :

- A. Sont utilisés, seulement dans le traitement du cancer du sein métastatique, chez la femme ménopausée
- B. Bloquent la synthèse d'œstrogènes après la ménopause
- C. Leur efficacité est supérieure, en terme de taux de survie, à celle du Tamoxifène.
- D. Sont commercialisés sous une seule forme
- E. Présentent une toxicité veineuse thromboembolique, supérieure à celle causée par le Tamoxifène.

B

Q.6. Les cancers hormonodépendants répondent au traitement hormonal.

- A. Par une régression totale et définitive
 - B. Si les patients présentent des RE positifs et des RP négatifs
 - C. Si les patients présentent des RE négatifs et des RP négatifs
 - D. Si les patients présentent des tumeurs bien différenciées
 - E. Si l'intervalle libre entre le traitement initial et la rechute est court.
- B.D

Q.7. L'action des anti vitamines K peut-être modifier par l'association de quel(s) élément(s) ?

- ~~A. Aliments pauvres en vitamine K~~
- ~~B. Aliments pauvres en vitamine K~~
- ~~C. Sulfamides hypoglycémiant~~
- ~~D. Aspirine à dose anti-inflammatoire~~
- E. Paracétamol.

B.C

Q.8. Parmi les complications suivantes, la (les) quelle (s) impose (ent) l'arrêt immédiat d'une chimiothérapie anticancéreuse :

- A. Les complications infectieuses
- B. Les complications osseuses
- C. Les complications pulmonaires
- D. Les complications cardiaques
- E. Les complications hématologiques.

C.D

Q.9. Les psychotropes sont des substances pharmacologiques qui agissent sur :

- A. L'affectivité, la cognition et la personnalité
- B. Le comportement, l'affectivité et la cognition
- C. Le comportement, l'anxiété et l'affectivité
- D. La personnalité, la cognition et les relations sociales
- E. La qualité ou la quantité de certains neurotransmetteurs.

C.E

Q.10. Les dyskinésies sont représentées par:

- A. Un fourmillement des extrémités
- B. Des crises de panique
- C. Un Plafonnement du regard
- D. Des crises oculogyres
- E. Une confusion mentale.

C.D

Q.11. Le syndrome cave supérieur constitue une urgence majeure qui nécessite une association de plusieurs traitements, lesquels ?

- A. Une chirurgie suivie d'une chimiothérapie
- B. Une chimiothérapie suivie d'une radiothérapie
- C. Une radiothérapie puis une chimiothérapie
- D. Une corticothérapie

E. Une chimioradiothérapie concomitante.

C

Q.12. Quel(s) élément(s) doit-on prendre en considération avant la prescription d'une association médicamenteuse ?

- A. La prise d'une phytothérapie
- B. L'absence d'inducteurs enzymatiques
- C. L'absence d'inhibiteurs enzymatiques
- D. Aucune précaution n'est nécessaire.
- E. L'automédication

A, E

Q.13. L'hépatite chronique médicamenteuse peut s'observer :

- A. Quand les lésions hépatiques se développent brutalement
- B. Quand la prescription du médicament impliqué n'a pas été reconnue et que son administration est poursuivie
- C. Quand l'agent responsable a été interrompu mais ré-administré ultérieurement après la guérison complète
- D. Quand le processus aboutissant à l'atteinte hépatique persiste malgré la poursuite de l'administration de l'agent responsable
- E. Toutes les réponses sont justes.

B

Q.14. Les particularités en rapport avec la présentation clinique entre le sujet âgé et le sujet adulte sont :

- A. La détérioration constante de l'état de santé
- B. L'iatrogénie
- C. La résistance du sujet âgé devant la maladie
- D. Le mauvais indice de Karnovsky
- E. La spécificité de certaines pathologies dues à l'âge.

D.B

Q.15. Chez le sujet âgé, l'altération de la fonction digestive est la conséquence de :

- A. Les troubles du transit
- B. Les troubles de la sécrétion d'acide chloridrique
- C. L'atrophie villositaire
- D. L'atrophie des muqueuses
- E. La maladie ulcéreuse

A.B.D

Q.16. Une compression médullaire est une urgence absolue, qui se traite par :

- A. Une laminectomie puis radiothérapie à la dose de 45 Gy
- B. Une corticothérapie à forte dose associée à une irradiation localisée
- C. Une laminectomie sur plusieurs étages seulement
- D. Un traitement par chimiothérapie

E. Un traitement symptomatique seulement.

A.B

Q.17. Concernant le vaccin anti tétanique, lesquelles de ces propositions sont justes :

A. C'est un vaccin vivant atténué

B. Ne peut pas être administré chez la femme enceinte pendant le 1^{er} trimestre

C. La dose de l'anatoxine diphtérique est la même dans les vaccins pour nourrissons et pour adultes

D. En cas de plaies importantes, la vaccination est obligatoire chez un enfant dont le dernier rappel remonte à moins de 5 ans

E. Les rappels au delà de 18 ans sont nécessaires

E

Q.18. Lesquels de ces vaccins peuvent être administrés chez l'enfant de moins de 6 mois :

A. Le vaccin anti pneumococcique à 23 valences (Pneumo23)

B. Le vaccin anti pneumococcique à 11 valences (Prenevar13)

C. Le vaccin contre la rougeole

D. Le vaccin anti Haemophilus influenzae b

E. Vaccin anti HPV (*papillomavirus humains*).

D

Q.19. Un neuroleptique à action prolongé est indiqué dans :

A. La psychose aiguë

B. Seulement dans la psychose chronique

C. La dépression

D. Le trouble anxieux

E. L'épilepsie.

A

Q.20. Le syndrome malin est suspecté devant :

A. Hypothermie

B. Augmentation des CPK

C. Vomissement incoercible

D. Rigidité

E. Pollakiurie

C.D