

Cochez-la ou les bonnes réponses.

Q.1. Quelles sont les associations possibles dans le traitement hormonale du carcinome du sein hormono-sensible chez la femme en activité génitale ?

- A. Antiestrogène- antiaromatase stéroïdien
- B. Suppression ovarienne- antiaromatase
- C. Castration médicamenteuse- ovariolyse radique
- D. Antiestrogène pur- antiaromatase
- ✓ E. Suppression ovarienne- antiestrogène

$\frac{1}{2}$

Q.2. Pour l'adénocarcinome de la prostate à haut risque, quelle(s) hormonothérapie(s) choisir en première ligne:

- ✓ A. Anti androgène + castration médicamenteuse
- ✓ B. Antiestrogènes
- ✓ C. Castration médicamenteuse
- ✓ D. Orchidectomie
- ✓ E. Anti androgène

X

Q.3. Quel est le traitement le plus adapté chez un homme de 68 ans atteint d'un carcinome bronchique localement avancé avec perturbation de la fonction rénale:

- ✓ A. Favoriser le traitement palliatif
- ✓ B. Faire le traitement standard en adaptant la posologie à la fonction rénale
- ✓ C. Éviter la radiothérapie
- ✓ D. Éviter la chimiothérapie
- ✓ E. Éviter les thérapies ciblées

Λ

Q.4. Pour favoriser la compliance aux traitements du sujet âgé on doit :

- ✓ A. Choisir le médicament ayant la demi vie la plus longue
- ✓ B. Choisir le médicament à marge thérapeutique étroite
- ✓ C. Évaluer la disponibilité de l'entourage pour assister le patient dans la prise des médicaments
- ✓ D. Adapter la dose à la fonction rénale
- ✓ E. S'assurer de la compréhension du patient et de son entourage

X

Cas clinique

Un patient est admis en urgence pour une rhabdomyolyse sans contexte traumatique

Q.5. Quels sont les éléments à prendre en considération pour la prise en charge ?

- ✓ A. Une automédication
- ✓ B. Les antécédents du patient
- ✓ C. Une insuffisance rénale
- ✓ D. Une polymédication
- ✓ E. La prise d'Aspirine

Λ

Q.6. L'entourage vous précise qu'il est traité uniquement pour une dyslipidémie depuis des années avec le même médicament bien toléré : Quels sont les éléments à rechercher pour expliquer la survenue de la rhabdomyolyse ?

- A. La prise de paracétamol
- B. La prise d'un antifongique
- C. La prise d'une statine
- D. La prise de Méthotrexate
- E. La consommation d'alcool

Λ

Q.7. Vous évoquez une interaction avec le pamplemousse, quel (s) en serait (ent) le(s) mécanisme(s) ?

- A. Diminution de la biodisponibilité du médicament
- B. Inhibition de l'activité des cytochromes
- C. Compétition pour la sécrétion tubulaire
- D. Mécanisme pharmacodynamique
- E. Induction de l'activité des cytochromes

Λ

Q.8. La vaccination anti- CoViD (contre le SARS-Cov2) a pour objectif de réduire :

- A. le nombre des cas CoVid 19 chez 80 % de la population générale
- B. les admissions des cas de CoViD 19 avec TDM positifs
- C. les admissions des cas graves en soins intensifs
- D. Les décès par CoViD 19
- E. Les facteurs de risque avérés de développer une forme sévère de la CoViD-19

Λ

Q.9. Le vaccin antirabique est fait systématiquement en cas de :

- A. Morsure par un animal suspect de rage
- B. Léchage sur une peau saine
- C. Quel que soit la nature de l'exposition à un animal suspect
- D. Uniquement en cas de plaie (morsure) profonde
- E. Quel que soit le grade de la morsure

CT  
E α

Q.10. Pour dénouer des conflits psychiques, la fonction des thérapies familiales est :

- A. De prendre en charge le malade seul
- B. La famille seule
- C. Le malade et sa mère
- D. Le malade et son père
- E. Le malade et sa famille

Λ

Q.11. L'EMDR est recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme thérapie de choix dans :

- A. L'état de stress post-traumatique
- B. Le trouble obsessionnel
- C. Le trouble panique
- D. Les schizophrénies
- E. Les démences

Λ



Q.12. Tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) :

- A. Inhibent la synthèse des prostaglandines.
- B. Inhibent de façon spécifique les facteurs de la coagulation.
- C. Exposent les patients à un risque de dépendance lorsqu'ils sont pris de façon prolongée.
- D. Ont des propriétés antipyrétiques et antalgiques.
- E. Sont susceptibles de provoquer des lésions gastriques graves.

Q.13. Patient de 75 ans suivi pour HTA sévère traité par : IEC, Inhibiteur Calcique et diurétiques, se présente à votre consultation pour poussée aiguë d'arthrose des genoux, vous prescrivez :

- A. Un antalgique seul
- B. Un antalgique associé à un AINS : Paracétamol et kétofrofène
- C. Deux AINS associés : Kétoprofène et Diclofénac
- D. Un AINS à libération prolongé : Kétofrofène LP
- E. De l'hydrocortisone

Q. 14. Parmi les indications des glucocorticoïdes de synthèse, on retient :

- A. Lupus érythémateux systémique.
- B. Colites inflammatoires.
- C. Polyarthrite rhumatoïde.
- D. Poussée aiguë d'arthrose.
- E. La maladie d'Addison.

Q.15. Concernant les effets secondaires de la corticothérapie au long court, on retient :

- A. L'hyperglycémie
- B. L'hypokaliémie
- C. Hyperkaliémie
- D. L'ostéoporose
- E. Augmentation des transaminases.

Q. 16. Les Anthracyclines :

- A. Font partie de la classe des Agents intercalants.
- B. Sont des Inhibiteurs de la topoisomérase I.
- C. Intervenant seulement dans la transcription et la réparation de l'ADN.
- D. Représentent des antimétabolites essentiels dans le traitement du cancer du sein.
- E. Sont néphrotoxiques.

Q.17. Les Sels de platine :

- A. Sont des Antimétabolites ;
- B. Sont des agents alkylants qui empêchent le dédoublement de l'ADN et la transcription.
- C. Sont indiqués surtout dans le traitement du cancer du sein ;
- D. Sont cardiotoxiques et hépatotoxiques ;
- E. Entraînent une toxicité rénale et auditive.

Q. 18. Au cours de l'insuffisance rénale, quels sont les effets secondaires de l'utilisation des béta-lactamines ?

- A. La survenue d'une perturbation du bilan hépatique.

- B. Les crises convulsives.
- C. Les réactions d'hypersensibilité.
- D. Les déficits neurologiques.
- E. L'agranulocytose.

^

Q.19. Le Premier passage d'un médicament est :

- A. L'extraction par le foie d'une substance présente dans le sang portal.
- B. La transformation des médicaments en des métabolites réactifs
- C. Augmentée par l'effet shunt.
- D. Assuré par le cytochrome P450
- E. Freiné par la prise d'alcool.

^

Q. 20. Le diagnostic d'une hépatite médicamenteuse :

- A. Est fondé sur l'interrogatoire du patient.
- B. Est caractérisé par des signes typiques.
- C. Est fondé sur l'exclusion d'une autre cause d'atteinte hépatique.
- D. Est confirmé par la disparition des signes après arrêt du médicament.
- E. Toutes les réponses sont justes.

^



# Département de Médecine de Constantine-Epreuve de SYNTHESES de THERAPEUTIQUE-A6- LE 25-07-2022

Date de l'épreuve : 25/07/2022

Corrigé Type

Barème par question : 1,000000

N°	Rép./Alternatives 1&2		
1	BE		
2	AC	C	
3	B		
4	CE		
5	ABCD		
6	BC		
7	B		
8	CD		
9	A		
10	E		
11	A		
12	ADE		
13	A		
14	ABC		
15	ABD		
16	AD		
17	BE		
18	BD		
19	A		
20	ACD		

  
**DR. TALEB .S**  
M. A. Onco-Radiothérapie  
N° d'Ordre: 25/4720